

<http://www.cpalb.fr/la-flore-lacustre-la-laiche>



# La flore lacustre - La Laïche paniculée

CLUB DE PLONGÉE  
lac du Bourget  
- Le coin biologie - La flore lacustre -



Date de mise en ligne : dimanche 20 septembre 2015

---

Copyright © Club de plongée d'Aix les Bains, lac du Bourget - Tous droits

réservés

---

<dl class='spip\_document\_1604 spip\_documents spip\_documents\_right' style='float:right;'>

La Laïche paniculée

# Laïche paniculée

**Nom binominal** Carex paniculata

- Règne : Plantae
- Sous-règne : Tracheobionta
- Division : Magnoliophyta
- Classe : Liliopsida
- Sous-classe : Commelinidae
- Ordre : Cyperales
- Famille : Cyperaceae
- Genre : Carex

C'est une espèce commune dans les lieux marécageux et au bord des eaux. Cette plante très cespiteuse [1] forme de grosses touffes sur des touradons [2]. Ils grandissent donc avec elle. Il n'y a pas que cette laïche qui forme des touradons mais les siens sont particulièrement gros. Les longues feuilles dépassent souvent les inflorescences. Ces dernières sont formées d'épis serrés, groupés en panicules [3] denses. Les écailles des fleurs ont une large bordure membraneuse. Les utricules [4] sont bruns, luisants et peu nervés. Carex appropinquata Schumacher est une espèce proche, plus petite et moins commune, qui se distingue par ses écailles femelles à bordure membraneuse étroite et par ses utricules mats et bien nervés.

**Écologie** Marais de presque toute la France ; nul dans la région méditerranéenne.

**Répartition** Europe ; Caucase, Sibérie ; Canaries.

**Floraison** Mai-juillet.

---

[1] En botanique, le terme cespiteux désigne une plante ou un champignon formant à sa base une touffe compacte. Ce terme désigne également un type de bambou dont les rhizomes ne sont pas traçants. Beaucoup de plantes de la famille des Poaceae sont cespiteuses. Quelques exemples

## La flore lacuste - La Laïche paniculée

---

: la Canche cespiteuse (*Deschampsia cespitosa*), la Flouve odorante (*Anthoxanthum odoratum*)... Certaines plantes, comme la Canche cespiteuse, peuvent former des touradons par accumulation de matière sèche à leur base.

[2] « Touradon » est le nom donné en botanique aux structures en mottes arrondies (40 à plus de 60 cm de haut) formées dans certaines tourbières ou zones humides paratourbeuses par la pousse annuelle de certaines plantes cespiteuses sur leurs anciennes racines et feuilles mortes, en décomposition ralentie par l'acidité du milieu. C'est le cas des touffes de Molinie en particulier.

[3] une panicule est une inflorescence composée, formée par une grappe de grappes sur un axe simple. (Exemple de panicule le troène). Le terme est souvent employé pour désigner des inflorescences souples, lâches et retombantes, comme celles de nombreuses Poacées (ou graminées) mais pour ses fleurs mâles, roseaux (phragmites), avoineâ€!

[4] Organe de certaines plantes, en forme de petite outre, leur servant de flotteur ou de piège à insectes.